

КАРТКА ПРЕПАРАТУ:

Повна назва: МЕДЯН ЕКСТРА®
350 SC, КС

Діюча речовина: хлорокис міді,
350 г/л

Препаративна форма:
концентрат суспензії

Спосіб дії: контактний

Клас небезпечності: 2

Упаковка: 20 мл, 1 л



Високоєфективний фунгіцид контактної дії проти грибкових та бактеріальних хвороб



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- препарат має широкий спектр протигрибкової та бактерицидної дії;

- має зручну у використанні рідку препаративну форму;
- чудово розчиняється та гарно покриває поверхню рослин та плодів;
- затверджений Органік Стандарт для використання в органічному землеробстві.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ У ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ:

Культура	Хвороба	Норма витрати, препарату	Спосіб, час обробок	Макс. кратність обробок	Строк останньої обробки до збирання врожаю
Яблуня	Парша, плямистості	20 мл/8-10 л води/2-5 дерев	Обприскування в період вегетації	2	20
Картопля	Фітофтороз, макроспоріоз	20 мл/5 л води/100 м ²		3	20

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ У ПРОМИСЛОВИМУ СЕКТОРІ:

Культура	Хвороба	Норма витрати препарату, л/га	Розрахункова норма витрати на 100 м ²	Спосіб, час обробок	Макс. кратність обробок	Строк останньої обробки до збирання врожаю
Виноград	Антракноз, міддю	2,5-3,5	25-35 мл/8 л води	Обприскування в період вегетації	4	30
Томати	Фітофтороз, макроспоріоз, бура плямистість	2,0-2,5	20-25 мл/5 л води		3	14
Огірки	Переноспороз, антракноз, бактеріоз					

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:

- препарат використовують як профілактичний, бактерицидний та дезінфікуючий засіб
- препарат використовують у випадку підвищеного ризику появи хвороби – профілактично, або за появи перших ознак хвороби
- обприскування проводять вранці або ввечері
- повторні обробки проводять з інтервалом 7-10 днів залежно від погодних умов
- культури обробляти до стану «цілковито мокрі»

- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** не застосовувати в суміші із продуктами, що містять фосфати (наприклад, монокалій фосфат)!



Переглянути відео про продукт:
www.youtube.com/watch?v=aEPHeMdFaxw

