

# МОСПІЛАН®

モスピラン

Могутній винищувач  
шкідників!



## КАРТКА ПРЕПАРАТУ:

Повна назва: МОСПІЛАН®, ВР

Діюча речовина: ацетаміпрід,  
200 г/кг

Препаративна форма:  
водорозчинний порошок

Спосіб дії: системний

Клас небезпечності: 2

Упаковка: 8 г, 50 г, 400 г

## ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- оригінальний японський інсектицид найвищої якості;
- безпечний для бджіл, джмелів та корисних комах – може використовуватись у період цвітіння;
- ефективний проти дорослих комах, личинок та проявляє непряму овіцидну дію (знищує личинок під час відродження з яєць, оброблених препаратом);
- результат дії препарату помітний уже за годину після обприскування;
- висока біологічна ефективність незалежно від температур (починає ефективно працювати вже при +5°C).

## РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ У ПРОМИСЛОВОМУ СЕКТОРІ

Культура	Шкідники	Норма витрати препарату, кг/га	Розрахована норма витрати на 100 м²	Спосіб, час обробок	Макс. кратність обробок	Строк останньої обробки до збирання врожаю
Яблуня	Яблунева пло- дожерка	0,2-0,5	2-5 г/ 10 л води	Обприскування в період вегетації по відродженню гусені I та II покоління	2	45
Яблуня	Попелиці, яблунева та мінуючі молі, розанна та сітчаста листокруткі, яблуневий пильщик			Обприскування в період вегетації		
Яблуня	Каліфорнійська щитівка	0,4-0,5	4-5 г/ 10 л води	Обприскування дерев на початку розпускання бруньок (по щитку) та влітку – під час відродження личинок-мандрівниць	2	3
Томати та огірки закритого ґрунту	Теплична білокрилка, оранжерейна попелиця, персикова попелиця, баштанна попелиця, трипси	0,2-0,3	2-3 г/ 5 л води	Обприскування в період вегетації		

Ріпак озимий та ярий	Ріпаківий квіткоїд, хрестоцвітні блішки, попелиці, ріпаківий довгоносок, ріпаківий пильщик, ріпаківий клоп, прихованохоботники, капустяний стручковий комарик	0,10-0,12	1-1,2 г/3 л води	Обприскування в період вегетації (перед цвітінням, на початку цвітіння, під час цвітіння та в кінці цвітіння)	2	30
Пшениця озима	Личинки клопа-шкідливої черепашки, попелиці, трипси, п'явиці	0,10-0,12	1-1,2 г/3 л води	Обприскування посівів в період вегетації, але не пізніше фази «молочної стиглості зерна»	2	30
Соняшник, люцерна, буряки цукрові	Саранові, Бурякові довгоносики, бурякові блішки, щитоноски, піщаний мідляк, бурякова листкова попелиця	0,050-0,075	0,5-0,75 г/3 л води	Обприскування в період вегетації	1	40
Картопля*	Колорадський жук	-	0,5 г/3-4 л води	Обприскування в період вегетації	2	35

\* - реєстрація в приватному секторі

## ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:

- вміст пакету 8 г розчинити у 16-20 л води згідно регламентів, які наведені в таблиці;
- препарат має системну дію, тому ефект застосування проявляється також на необроблених частинах;
- шкідники гинуть від безпосереднього контакту з препаратом, так і від поїдання обробленої рослини;
- період захисної дії 14-21 день;
- добре сумісний з багатьма пестицидами, за винятком сильно лужних;
- **для покращення покриття рослин та прискорення стартової дії на шкідників рекомендуємо додавати у бакову суміш ад'ювант-розповсюджувач СКАБА (5 мл на 10 л води).**



Згідно реєстрації в Євросоюзі та проведеним дослідженням в Україні МОСПІ-ЛАН дозволений до використання в період цвітіння саду та ріпаку!



mospilan.com.ua



Відео-запис прямого ефіру:  
[www.youtube.com/watch?v=HeoUQJc7Ups](https://www.youtube.com/watch?v=HeoUQJc7Ups)

