


# ТАРГА® МАКС >>

## МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ПРОТИ ЗЛАКОВИХ БУР'ЯНІВ



Максимальний захист посівів від злакових бур'янів!



## КАРТКА ПРЕПАРАТУ:

Повна назва: ТАРГА® МАКС, КЕ

Діюча речовина: хізалопф-п-етил, 100 г/л

Препаративна форма: концентрат, що емульгується

Спосіб дії: системний

Клас небезпечності: 3

Упаковка: 100 мл

## ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- оригінальний японський грамініцид найвищої якості!
- максимально ефективна стабільна робота і висока безпека для культури навіть у складних погодних умовах;
- дощ, що пройшов уже через годину після обробки, не впливає на ефективність препарату;
- може використовуватися за понижених температур (від +7°C на момент обробки);
- запобігає повторному відростанню багаторічних злакових бур'янів.

## РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ У ПРОМИСЛОВОМУ СЕКТОРІ

Культура	Бур'яни	Норма витрати препарату, л/га	Розрахункова норма витрати на 100 м <sup>2</sup>	Спосіб, час обробок	Макс. кратність обробок
Картопля, морква, капуста білокачанна, цибуля, томати, огірки, горох, буряки столові	Однорічні злакові бур'яни	0,5-0,75	5-7,5 мл/2 л води	Обприскування вегетуючої культури, від фази 2-4 листків до кінця кущення у бур'янів	1
	Багаторічні злакові бур'яни в т.ч. тонконіг однорічний	1,0-1,5	10-15 мл/2 л води	Обприскування вегетуючої культури за висоти бур'янів 10-15 см	
Соняшник	Падалиця зернових	0,35-0,5	3,5-5 мл/2 л води	Обприскування вегетуючої культури, від фази 2-4 листків до кінця кущення у бур'янів	1
	Однорічні злакові бур'яни	0,5-0,75	5-7,5 мл/2 л води		

## ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:

- найкращий час для використання препарату є фаза 3-5 листків у однорічних бур'янів (10-15 см у пірію звичайного);
- найвища ефективність препарату проявляється, коли бур'яни знаходяться в стані активного росту, при теплій погоді і достатній вологості ґрунту. За таких умов **ТАРГА МАКС** використовується в мінімально рекомендованих нормах;
- завдяки швидкому розкладанню діючої речовини у ґрунті (7 днів), препарат не впливає на наступні культури сівозміни;
- **ТАРГА МАКС** можна використовувати в суміші з інсектицидами, фунгіцидами, а також іншими сучасними післясходовими гербіцидами проти широколистяних бур'янів;
- механічні обробки проводити не раніше, ніж за 5 днів після застосування препарату;
- якщо обробка **ТАРГА МАКС** відбувається у прохолодну погоду, потрібно враховувати, що швидкість дії гербіциду при цьому знижується. Не застосовувати при загрозі заморозків.